

Center for **Kliniske Retningslinjer**

- Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Titel	Klinisk retningslinje for lejrning af det præmature barn.
Søgeord	<i>Hovedsøgeord</i> : Søvn og hvile <i>Andre søgeord</i> : lejrning, præmatur, neonatologi, respiration, infant care, infant premature, preterm children, positioning, prone position, supine position, positioning, methods, positioning tools, positioning devices, posture, developmental care, neonatal intensive care, nidcap, sideleje, rygleje, maveleje, tidigt, tidigt andning, page hydr, mage hydr, rygläge stålning
Formål	Formålet med den kliniske retningslinje er at opstille evidensbaserede anbefalinger til lejrning af det præmature barn, således at : <ul style="list-style-type: none"> • Stress, og unødigt belastning forebygges, så barnets trivsel og udvikling støttes og sikres. • Respiration og iltning optimeres. • Afklaring opnås om hvornår, og hvorfor forskellige lejringer af det præmature barn anbefales og foretrækkes. • at forebygge fejlstilling og sikre normal udvikling af barnets knogler, led og muskler.
Patientgruppe	Præmature børn med gestationsalder mellem 28 og 32 uger. Eksklusionskriterier : børn født med gestationsalder under 28 uger, børn født med gestationsalder over 32 uger, svært syge børn (respirator krævende, eller født med syndromer), børn med abstinenser, eller i sederende behandling.
Målgruppe	Plejepersonale indenfor det neonatale speciale af pædiatrien.
Tidshorisont	
Kontaktperson	Lotte Nørreslet Sygeplejerske, NIDCAP observatør, klinisk sygeplejespecialist Tovholder i arbejdsgruppen : "Nationale guidelines – lejrings gruppen".