

Center for **Kliniske Retningslinjer**

- Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Titel	<i>Forholdsregler efter Koronararteriograf(KAG) eller Pertutan coronar intervention(PCI) foretaget via a. radialis.</i>
Fokuserede spørgsmål	<i>Hvilke fysiske restriktioner er der efter KAG/PCI hvor katherisation er foretaget via a. radialis</i>
Søgeord	<i>Søgeord: Aktivitet Andre søgeord: Mobilisering, restriktioner, koronararteriografi, blødning, a.radialis, PCI, KAG</i>
Formål	<i>Formålet med den kliniske retningslinie er at opstille evidensbaserede anbefalinger vedr. fysiske restriktioner for patienter der har fået foretaget KAG/PCI via a. radialis i timer til dage efterindgrebet.</i>
Patientgruppe	<i>Patienter der har fået foretaget KAG/PCI via a. radialis</i>
Målgruppe	<i>Den kliniske retningslinie henvender sig til kardiologiske sygeplejersker, læger samt patienter.</i>
Tidshorisont	<i>Den kliniske retningslinje forventes indsendt til godkendelse okt 2012</i>
Kontaktperson	<i>Margrethe Hering, margrethe.hering.regionh.dk Gentofte Hospital 39 77 30 33</i>